

Indice et formes linéaires stables dans les algèbres de Lie

Patrice Tauvel¹ et Rupert W.T. Yu²

UMR 6086 du C.N.R.S.,
Département de Mathématiques,
Université de Poitiers,
Téléport 2 – BP 30179,
Boulevard Marie et Pierre Curie,
86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex,
FRANCE.

Résumé

On caractérise, de manière purement algébrique, certaines formes linéaires, dites stables, introduites dans [7], sur une algèbre de Lie. Comme application, on détermine l'indice d'une sous-algèbre de Borel d'une algèbre de Lie semi-simple. On donne enfin un exemple d'une sous-algèbre parabolique d'une algèbre de Lie semi-simple n'admettant aucune forme linéaire stable.

Abstract

We characterize, in a purely algebraic manner, certain linear forms, called stable, introduced in [7], on a Lie algebra. As an application, we determine the index of a Borel subalgebra of a semi-simple Lie algebra. Finally, we give an example of a parabolic subalgebra of a semi-simple Lie algebra which does not admit any stable linear form.

1 Formes linéaires stables

1.1. Dans la suite, $\mathbb{k}$ est un corps commutatif algébriquement clos de caractéristique nulle. Les algèbres de Lie considérées sont définies et de dimension finie sur $\mathbb{k}$. Si V est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel de dimension finie, on le munit

¹E-mail: tauvel@mathlabo.univ-poitiers.fr

²E-mail: yuyu@mathlabo.univ-poitiers.fr

de la topologie de Zariski. Si G est un groupe algébrique, on note $\mathcal{L}(G)$ son algèbre de Lie. On renvoie à [3] et [8] pour les concepts généraux utilisés.

1.2. Soient $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie, $\mathfrak{g}^*$ son dual. Si $\mathfrak{a}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathfrak{g}$, on note $\mathfrak{a}^\perp$ son orthogonal dans $\mathfrak{g}^*$.

On fait opérer $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g}^*$ au moyen de la représentation coadjointe. Ainsi, si $x, y \in \mathfrak{g}$ et $f \in \mathfrak{g}^*$, on a :

$$(x.f)(y) = f([y, x]).$$

Avec les notations précédentes, on définit une forme bilinéaire alternée Φ_f sur $\mathfrak{g}$ en posant :

$$\Phi_f(x, y) = f([x, y]).$$

Le noyau de Φ_f est noté $\mathfrak{g}^f$. On a :

$$(\mathfrak{g}^f)^\perp = \mathfrak{g}.f, \quad [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp = \{g \in \mathfrak{g}^*; \mathfrak{g}^f \subset \mathfrak{g}^g\}.$$

L'entier $\chi(\mathfrak{g}) = \inf\{\dim \mathfrak{g}^f; f \in \mathfrak{g}^*\}$ est appelé l'indice de $\mathfrak{g}$. On dit que f est régulier si $\dim \mathfrak{g}^f = \chi(\mathfrak{g})$. L'ensemble $\mathfrak{g}_r^*$ des éléments réguliers de $\mathfrak{g}^*$ est un ouvert non vide de $\mathfrak{g}^*$.

1.3. Soient $\text{Aut } \mathfrak{g}$ le groupe des automorphismes de $\mathfrak{g}$ et K un sous-groupe algébrique de $\text{Aut } \mathfrak{g}$, d'algèbre de Lie $\mathfrak{k}$. Le groupe K opère rationnellement sur $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^*$. Pour $\alpha \in K$, $f \in \mathfrak{g}^*$ et $x \in \mathfrak{g}$, on a $(\alpha.f)(x) = f(\alpha^{-1}(x))$. La différentielle de cette opération définit une action de $\mathfrak{k}$ sur $\mathfrak{g}^*$; si $X \in \mathfrak{k}$, on a $(X.f)(x) = -f(X(x))$. On pose :

$$\mathfrak{k}_f = \{X \in \mathfrak{k}; X.f = 0\}, \quad \mathfrak{k}^{(f)} = \{x \in \mathfrak{g}; (\mathfrak{k}.f)(x) = \{0\}\}.$$

On a ainsi $(\mathfrak{k}^{(f)})^\perp = \mathfrak{k}.f$. Si K contient le groupe adjoint algébrique de $\mathfrak{g}$, alors $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{g} \subset \mathfrak{k}$, donc $\mathfrak{k}^{(f)} \subset \mathfrak{g}^f$.

La forme bilinéaire $(X, x) \rightarrow f(X(x))$ sur $\mathfrak{k} \times \mathfrak{g}$ induit une forme bilinéaire non dégénérée sur $(\mathfrak{k}/\mathfrak{k}_f) \times (\mathfrak{g}/\mathfrak{k}^{(f)})$. Par suite :

$$\dim \mathfrak{k} - \dim \mathfrak{k}_f = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{k}^{(f)}.$$

Définition. On dit que $f \in \mathfrak{g}^*$ est K -stable s'il existe un voisinage V de f dans $\mathfrak{g}^*$ tel que, pour tout $g \in V$, $\mathfrak{g}^g$ et $\mathfrak{g}^f$ soient K -conjugués. Si K est le groupe adjoint algébrique de $\mathfrak{g}$ (resp. si $K = \text{Aut } \mathfrak{g}$), une forme linéaire K -stable est dite stable (resp. faiblement stable).

1.4. Lemme. Soit $f \in \mathfrak{g}^*$. On suppose que K est connexe et que le morphisme

$$\psi: K \times [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \rightarrow \mathfrak{g}^*, (\alpha, h) \rightarrow \alpha(h)$$

est dominant. Alors :

- (i) $f \in \mathfrak{g}_r^*$.
- (ii) Soit $W = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \cap \mathfrak{g}_r^*$. La restriction de ψ à $K \times W$ est une application ouverte.

Preuve. D'après ([2], corollaire, p. 109), l'image de ψ contient un ouvert non vide de $\mathfrak{g}^*$ donc un élément $g \in \mathfrak{g}_r^*$. Si $\alpha \in K$ et $h \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$ vérifient $g = \alpha(h)$, il vient $\alpha(\mathfrak{g}^f) \subset \alpha(\mathfrak{g}^h) = \mathfrak{g}^g$. D'où $f \in \mathfrak{g}_r^*$.

(ii) Soit $\varphi: K \times W \rightarrow \mathfrak{g}^*$ le morphisme induit par ψ . D'après (i), W est un ouvert non vide de $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$, donc φ est dominant.

Soient N le normalisateur de $\mathfrak{g}^f$ dans K , $\alpha \in K$, et $g \in W$. On va déterminer la fibre $S = \varphi^{-1}(\varphi(\alpha, g))$.

Soient $\beta \in K$ et $h \in W$ vérifiant $\beta(h) = \alpha(g)$, donc $h = \beta^{-1}\alpha(g)$. Comme $\mathfrak{g}^h = \mathfrak{g}^g = \mathfrak{g}^f$, il vient $\beta^{-1}\alpha \in N$, soit $\beta \in \alpha N$. Il est alors immédiat que $S = \{(\alpha\gamma, \gamma^{-1}(g)); \gamma \in N\}$.

Or, S est le graphe du morphisme $\alpha N \rightarrow \mathfrak{g}^*$, $\gamma \rightarrow \gamma^{-1}\alpha(g)$, donc est isomorphe à N . Comme N est une variété pure, il résulte de ([2], corollaire 1, p. 113, et proposition 7, p. 141) que φ est une application ouverte. ■

1.5. Lemme. Soient K° la composante neutre de K et $f \in \mathfrak{g}^*$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est K° -stable.
- (ii) f est K -stable.

Si ces conditions sont vérifiées, on a $f \in \mathfrak{g}_r^*$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) C'est clair.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Soit U un voisinage ouvert de f dans $\mathfrak{g}^*$ tels que $\mathfrak{g}^h$ et $\mathfrak{g}^f$ soient K -conjugués pour tout $h \in U$. On a $U \cap \mathfrak{g}_r^* \neq \emptyset$, donc $f \in \mathfrak{g}_r^*$. Il en résulte que $W = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \cap \mathfrak{g}_r^*$ est un ouvert non vide $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$; c'est l'ensemble des $h \in \mathfrak{g}^*$ qui vérifient $\mathfrak{g}^h = \mathfrak{g}^f$.

Si $g \in U$, il existe $\alpha \in K$ tel que $\mathfrak{g}^g = \alpha(\mathfrak{g}^f)$, donc $\mathfrak{g}^{\alpha^{-1}(g)} = \mathfrak{g}^f$, puis $g \in \alpha(W)$. Définissons le morphisme $\psi: K \times W \rightarrow \mathfrak{g}^*$, $(\alpha, h) \rightarrow \alpha(h)$. Ce qui précède montre que l'image T de ψ contient U .

Notons $K_0 = K^\circ$, $K_1 = \alpha_1 K^\circ, \dots, K_r = \alpha_r K^\circ$ les composantes irréductibles deux à deux distinctes de K , avec $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$. Posons $S_i = K_i \times W$ et $T_i = \psi(S_i)$. De $U \subset T_0 \cup \dots \cup T_r$, on déduit $\mathfrak{g}^* = \overline{T_0} \cup \dots \cup \overline{T_r}$. L'espace $\mathfrak{g}^*$

étant irréductible, il existe un indice i tel que $\mathfrak{g}^* = \overline{T_i} = \overline{\alpha_i(T_0)} = \alpha_i(\overline{T_0})$. Par suite $\overline{T_0} = \mathfrak{g}^*$, et le morphisme $\varphi: K^\circ \times W \rightarrow \mathfrak{g}^*$ est dominant. D'après 1.4, φ est une application ouverte. Alors T_0 est un voisinage ouvert de f dans $\mathfrak{g}^*$ et, pour $g \in T_0$, $\mathfrak{g}^g$ et $\mathfrak{g}^f$ sont K° -conjugués. ■

1.6. Si $\varphi: X \rightarrow Y$ est un morphisme de variétés, et si $x \in X$, on note $d\varphi_x$ la différentielle de φ au point x et $T_x(X)$ l'espace tangent de X en x .

Lemme. Soient H un groupe algébrique, $\mathfrak{h}$ son algèbre de Lie, et π une représentation rationnelle de H dans un espace vectoriel V de dimension finie. On définit un morphisme de variétés :

$$\theta: H \times V \rightarrow V, (\beta, w) \rightarrow \pi(\beta)(w).$$

(i) Si $(\alpha, v) \in H \times V$ et $(x, w) \in T_\alpha(H) \times V$, on a :

$$d\theta_{(\alpha, v)}(x, w) = d\pi_\alpha(x)(v) + \pi(\alpha)(w).$$

(ii) Soit e l'élément neutre de H . Pour tout $(\alpha, v) \in H \times V$, les applications linéaires $d\theta_{(\alpha, v)}$ et $d\theta_{(e, v)}$ ont même rang.

Preuve. (i) Définissons des morphismes

$$p: H \rightarrow H \times V, \beta \rightarrow (\beta, v) \text{ et } q: V \rightarrow H \times V, w \rightarrow (e, w).$$

De $\theta \circ p(\beta) = \pi(\beta)(v)$ et $\theta \circ q(w) = \pi(e)(w)$, on déduit :

$$d(\theta \circ p)_\alpha(x) = d\pi_\alpha(x)(v), \quad d(\theta \circ q)_v(w) = \pi(e)(w).$$

D'autre part, on a $dp_\alpha(x) = (x, 0)$ et $dq_v(w) = (0, w)$. Alors :

$$\begin{aligned} d\pi_\alpha(x)(v) &= d(\theta \circ p)_\alpha(x) = d\theta_{(\alpha, v)} \circ dp_\alpha(x) = d\theta_{(\alpha, v)}(x, 0), \\ \pi(\alpha)(w) &= d(\theta \circ q)_v(w) = d\theta_{(\alpha, v)} \circ dq_\alpha(w) = d\theta_{(\alpha, v)}(0, w). \end{aligned}$$

Comme $d\theta_{(\alpha, v)}(x, w) = d\theta_{(\alpha, v)}(x, 0) + d\theta_{(\alpha, v)}(0, w)$, on a obtenu le résultat.

(ii) Fixons $\alpha \in H$, et considérons les isomorphismes de variétés :

$$\begin{aligned} \sigma: H \times V &\rightarrow H \times V, (\beta, w) \rightarrow (\alpha\beta, w), \\ \rho: V &\rightarrow V, w \rightarrow \pi(\alpha)(w). \end{aligned}$$

On a $\theta \circ \sigma = \rho \circ \theta$. Si $v \in V$, il vient donc $d(\theta \circ \sigma)_{(\alpha, v)} = d(\rho \circ \theta)_{(\alpha, v)}$, c'est-à-dire $d\theta_{(\alpha, v)} \circ d\sigma_{(\alpha, v)} = \pi(\alpha) \circ d\theta_{(\alpha, v)}$. D'où l'assertion. ■

1.7. Théorème. Soient $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie, $f \in \mathfrak{g}^*$, K un sous-groupe algébrique de $\text{Aut } \mathfrak{g}$, et $\mathfrak{k}$ l'algèbre de Lie de K . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f] \cap \mathfrak{k}^{(f)} = \{0\}$.
- (ii) La forme linéaire f est K -stable.

Preuve. On peut supposer que K est connexe (c'est clair pour (i) $\Rightarrow$ (ii) et, pour (ii) $\Rightarrow$ (i), cela résulte de 1.5). On note e l'élément neutre de K .

(i) $\Rightarrow$ (ii) On note $\psi: K \times [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \rightarrow \mathfrak{g}^*$ le morphisme $(\alpha, h) \rightarrow \alpha.h$. Soient $X \in \mathfrak{k}$ et $h \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$. D'après 1.6, il vient :

$$d\psi_{(e,f)}(X, h) = h + X.f.$$

L'image de $d\psi_{(e,f)}$ est donc $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp + \mathfrak{k}.f$, c'est-à-dire $\mathfrak{g}^*$ d'après l'hypothèse. On sait alors que ψ est dominant. Soit $W = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \cap \mathfrak{g}_r^*$. D'après 1.4, $\psi(K \times W)$ est un ouvert de $\mathfrak{g}^*$ contenant f et, si $g \in \psi(K \times W)$, $\mathfrak{g}^f$ et $\mathfrak{g}^g$ sont K -conjugués.

(ii) $\Rightarrow$ (i) On a $f \in \mathfrak{g}_r^*$ (1.5), donc $W = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp \cap \mathfrak{g}_r^*$ est un ouvert non vide de $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$; c'est l'ensemble des $h \in \mathfrak{g}^*$ tels que $\mathfrak{g}^h = \mathfrak{g}^f$.

Soit $\varphi: K \times W \rightarrow \mathfrak{g}^*$ le morphisme $(\alpha, h) \rightarrow \alpha.h$. Comme on l'a déjà dit, $\varphi(K \times W)$ est l'ensemble des $h \in \mathfrak{g}^*$ tels que $\mathfrak{g}^h$ et $\mathfrak{g}^f$ soient K -conjugués.

Pour $g \in W$ et $(X, h) \in \mathfrak{k} \times [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$, il vient :

$$d\varphi_{(e,g)}(X, h) = h + X.g.$$

L'image T_g de $d\varphi_{(e,g)}$ est donc $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp + \mathfrak{k}.g$.

Notons $\mathfrak{n}$ le normalisateur de $\mathfrak{g}^f$ dans $\mathfrak{k}$. On a :

$$(X.g)([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]) = g([X(\mathfrak{g}), \mathfrak{g}^f]) + g([\mathfrak{g}, X(\mathfrak{g}^f)]) = g([\mathfrak{g}, X(\mathfrak{g}^f)]).$$

Comme $\mathfrak{g}^g = \mathfrak{g}^f$, on en déduit que $X.g \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp$ si et seulement si $X \in \mathfrak{n}$. D'où :

$$\dim(\mathfrak{k}.g \cap [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp) = \dim \mathfrak{n}.g.$$

D'autre part, si $X \in \mathfrak{k}_g$, on a $X \in \mathfrak{n}$, car $X.g = 0$. D'où :

$$\dim \mathfrak{n}.g = \dim \mathfrak{n} - \dim \mathfrak{k}_g = \dim \mathfrak{n} - \dim \mathfrak{k} + \dim \mathfrak{k}.g.$$

On déduit de tout ceci que :

$$\dim T_g = \dim \mathfrak{k} - \dim \mathfrak{n} + \dim([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp).$$

En particulier, $\dim T_g$ ne dépend pas de g . Il résulte alors de 1.6 que, si $T_{(\alpha,g)}$ est l'image de $d\varphi_{(\alpha,g)}$, $\dim T_{(\alpha,g)}$ ne dépend ni de α , ni de g . Or, d'après les hypothèses, φ est dominant, donc il existe $(\alpha, g) \in K \times W$ tel que $T_{(\alpha,g)} = \mathfrak{g}^*$. On a alors $T_{(e,f)} = \mathfrak{g}^*$, soit $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f]^\perp + \mathfrak{k}.f = \mathfrak{g}^*$. Par suite, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f] \cap \mathfrak{k}^{(f)} = \{0\}$. ■

1.8. Corollaire. *Soit $f \in \mathfrak{g}^*$.*

- (i) *Si $\mathfrak{g}$ est ad-algébrique, f est stable si et seulement si $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f] \cap \mathfrak{g}^f = \{0\}$.*
- (ii) *Si $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^f] \cap \mathfrak{g}^f = \{0\}$, f est K -stable pour tout sous-groupe algébrique de $\text{Aut } \mathfrak{g}$ vérifiant $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{g} \subset \mathcal{L}(K)$, donc en particulier si K contient le groupe adjoint algébrique de $\mathfrak{g}$.*

Remarque. Le résultat de 1.7 est établi dans [7]. On n'a cependant utilisé ici que des méthodes purement algébriques.

2 Sous-algèbres de Borel

2.1. Dans toute cette section, $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie semi-simple, G son groupe adjoint, L sa forme de Killing, $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, et R le système de racines du couple $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$. Si $\alpha \in R$, $\mathfrak{g}^\alpha$ est le sous-espace radiciel de $\mathfrak{g}$ associé à α . On fixe une base Π de R , et on note R_+ (resp. R_-) l'ensemble des racines positives (resp. négatives) correspondant. On pose :

$$\mathfrak{n} = \sum_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}^\alpha, \quad \mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}.$$

Soient $\alpha, \beta \in R$. On fixe $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha \setminus \{0\}$, et on note H_α l'unique élément de $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}]$ tel que $\alpha(H_\alpha) = 2$. On a $\beta(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$. Si $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, on écrit $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle$ pour $\lambda(H_\alpha)$.

Pour toute partie S de Π , on note $\mathbb{Z}S$ (resp. $\mathbb{N}S$) l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers (resp. à coefficients entiers positifs ou nuls) des éléments de S . On pose :

$$R^S = R \cap \mathbb{Z}S, \quad R_+^S = R \cap \mathbb{N}S = R_+ \cap R^S.$$

L'ensemble R^S est un système de racines dans le sous-espace de $\mathfrak{h}^*$ qu'il engendre, S est une base de R^S , et R_+^S est l'ensemble des racines positives correspondant. Si S est une partie connexe de Π , le système de racines R^S est irréductible, et on note ε_S la plus grande racine de R^S .

Supposons S connexe. Pour toute racine $\alpha \in R_+^S \setminus \{\varepsilon_S\}$, on a $\langle \alpha, \varepsilon_S^\vee \rangle \in \{0, 1\}$. Si T est l'ensemble des éléments α de R^S qui vérifient $\langle \alpha, \varepsilon_S^\vee \rangle = 0$, on voit que T est un système de racines dans le sous-espace de $\mathfrak{h}^*$ qu'il engendre, et que $\{\alpha \in S; \langle \alpha, \varepsilon_S^\vee \rangle = 0\}$ est une base de T .

Si $\alpha \in T \cap R_+^S$, on a $\alpha + \varepsilon_S \notin R$ et $\alpha - \varepsilon_S \notin R$ ([1], proposition 9, p. 149). Ainsi, si $\alpha \neq \varepsilon_S$, les racines α et ε_S sont fortement orthogonales.

2.2. On va rappeler la construction et quelques propriétés d'un ensemble de racines deux à deux fortement orthogonales dans R (voir [5] et [6]).

Soit S une partie de Π . Par récurrence sur le cardinal de S , on définit un sous-ensemble $\mathcal{K}(S)$ de l'ensemble des parties de S de la manière suivante :

- a) $\mathcal{K}(\emptyset) = \emptyset$.
- b) Si $S_1, \dots, S_r$ sont les composantes connexes de S , on a :

$$\mathcal{K}(S) = \mathcal{K}(S_1) \cup \dots \cup \mathcal{K}(S_r).$$

- c) Si S est connexe, alors :

$$\mathcal{K}(S) = \{S\} \cup \mathcal{K}(\{\alpha \in S; \langle \alpha, \varepsilon_S^\vee \rangle = 0\}).$$

On a le résultat suivant :

Lemme. (i) *Tout $K \in \mathcal{K}(S)$ est une partie connexe de Π .*

(ii) *Si $K, K' \in \mathcal{K}(S)$, alors ou $K \subset K'$, ou $K' \subset K$, ou K et K' sont des parties disjointes de S telles que $\alpha + \beta \notin R$ pour $\alpha \in R^K$ et $\beta \in R^{K'}$.*

(iii) *Si K et K' sont des éléments distincts de $\mathcal{K}(S)$, ε_K et $\varepsilon_{K'}$ sont fortement orthogonales.*

2.3. Conservons les notations précédentes. Dans la suite, on note $\mathcal{K}$ pour $\mathcal{K}(\Pi)$ et, si $K \in \mathcal{K}$, on pose :

$$\Gamma^K = \{\alpha \in R^K; \langle \alpha, \varepsilon_K^\vee \rangle > 0\}, \quad \Gamma_0^K = \Gamma^K \setminus \{\varepsilon_K\}, \quad \mathfrak{a}_K = \sum_{\alpha \in \Gamma^K} \mathfrak{g}^\alpha.$$

Lemme. *Soient $K, K' \in \mathcal{K}$, $\alpha, \beta \in \Gamma^K$, et $\gamma \in \Gamma^{K'}$.*

(i) *On a $\Gamma^K = R_+^K \setminus \{\delta \in R_+^K; \langle \delta, \varepsilon_K^\vee \rangle = 0\}$.*

(ii) *L'ensemble R_+ est la réunion disjointe des $\Gamma^{K''}$ pour $K'' \in \mathcal{K}$, et $\mathfrak{a}_{K''}$ est une algèbre de Heisenberg, de centre $\mathfrak{g}^{\varepsilon_{K''}}$.*

(iii) *Si $\alpha + \beta \in R$, on a $\alpha + \beta = \varepsilon_K$.*

(iv) *Si $\alpha + \gamma \in R$, alors ou $K \subset K'$ et $\alpha + \gamma \in \Gamma^{K'}$, ou $K' \subset K$ et $\alpha + \gamma \in \Gamma^K$.*

2.4. Il est clair que le cardinal de $\mathcal{K}(\Pi)$ ne dépend que de $\mathfrak{g}$, mais pas de $\mathfrak{h}$ ou de Π . On note cet entier $k_{\mathfrak{g}}$. On donne dans le tableau suivant la valeur de $k_{\mathfrak{g}}$ pour les différents types d'algèbres de Lie simples. Si r est un nombre rationnel, $[r]$ désigne sa partie entière.

	$A_{\ell}, \ell \geq 1$	$B_{\ell}, \ell \geq 2$	$C_{\ell}, \ell \geq 3$	$D_{\ell}, \ell \geq 4$	E_6	E_7	E_8	F_4	G_2
$k_{\mathfrak{g}}$	$\left\lceil \frac{\ell+1}{2} \right\rceil$	ℓ	ℓ	$2 \left\lceil \frac{\ell}{2} \right\rceil$	4	7	8	4	2

2.5. Lemme. Soient $x \in \mathfrak{b}$ et

$$u = \sum_{K \in \mathcal{K}} X_{-\varepsilon_K}.$$

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $x \in \mathfrak{h}$ et $\varepsilon_K(x) = 0$ pour tout $K \in \mathcal{K}$.
- (ii) $[x, u] \in \mathfrak{n}$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) Si (i) est vérifié, on a $[x, u] = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Ecrivons

$$x = h + \sum_{\alpha \in R_+} a_{\alpha} X_{\alpha},$$

avec $h \in \mathfrak{h}$ et $a_{\alpha} \in \mathbb{k}$ pour $\alpha \in R_+$. On obtient

$$[x, u] \in \sum_{K \in \mathcal{K}} a_{\varepsilon_K} \lambda_K H_{\varepsilon_K} + \mathfrak{n} + \mathfrak{n}_-,$$

où $\lambda_K \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$ pour tout $K \in \mathcal{K}$. Les ε_K étant deux à deux fortement orthogonales, les H_{ε_K} sont linéairement indépendants. Par suite, $a_{\varepsilon_K} = 0$ pour tout $K \in \mathcal{K}$.

Soient $K \in \mathcal{K}$, $\alpha \in \Gamma_0^K$, et $\beta = \varepsilon_K - \alpha$. Il vient

$$\begin{aligned} [x, u] &= \lambda a_{\alpha} X_{-\beta} + a_{\alpha} \sum_{K' \in \mathcal{K} \setminus \{K\}} [X_{\alpha}, X_{-\varepsilon_{K'}}] \\ &\quad + \sum_{K' \in \mathcal{K}, \gamma \in R_+ \setminus \{\alpha\}} a_{\gamma} [X_{\gamma}, X_{-\varepsilon_{K'}}] - \sum_{K' \in \mathcal{K}} \varepsilon_{K'}(h) X_{-\varepsilon_{K'}}, \end{aligned}$$

avec $\lambda \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$.

On a $\beta \neq \varepsilon_K$ et $\beta \neq \varepsilon_{K'}$ si $K \neq K'$, car $\langle \beta, \varepsilon_K^\vee \rangle = 1$ et $\langle \varepsilon_{K'}, \varepsilon_K^\vee \rangle = 0$ si $K \neq K'$.

Supposons $a_\alpha \neq 0$. Il existe nécessairement $K' \in \mathcal{K}$ et $\gamma \in R_+ \setminus \{\alpha\}$ tels que $\beta = \varepsilon_{K'} - \gamma$.

On a $K' \neq K$, car $\mathfrak{a}_K$ est une algèbre de Heisenberg. Soit $K'' \in \mathcal{K}$ tel que $\gamma \in \Gamma^{K''}$. A nouveau, $K'' \neq K$. D'autre part, comme $\beta + \gamma = \varepsilon_{K'} \in R$, on déduit que $K \subset K''$, ou $K'' \subset K$ (2.3).

Supposons $K'' \subset K$. Les racines $\varepsilon_{K'}$ et γ sont fortement orthogonales à ε_K . D'où :

$$1 = \langle \beta, \varepsilon_K^\vee \rangle = \langle \varepsilon_{K'} - \gamma, \varepsilon_K^\vee \rangle = 0.$$

Contradiction.

Supposons $K \subset K''$. On a $\gamma \neq \varepsilon_{K''}$, car $\varepsilon_{K''}$ est la plus grande racine de $R^{K''}$. Ainsi :

$$\langle \gamma, \varepsilon_{K''}^\vee \rangle = 1, \quad \langle \beta, \varepsilon_{K''}^\vee \rangle = 0.$$

Par suite :

$$1 = \langle \gamma, \varepsilon_{K''}^\vee \rangle = \langle \beta + \gamma, \varepsilon_{K''}^\vee \rangle = \langle \varepsilon_{K'}, \varepsilon_{K''}^\vee \rangle \in \{0, 2\}.$$

C'est absurde.

On a donc prouvé que $a_\alpha = 0$ pour tout $\alpha \in R_+$. Il en résulte que $x \in \mathfrak{h}$, et que :

$$[x, u] = - \sum_{K \in \mathcal{K}} \varepsilon_K(h) X_{-\varepsilon_K}.$$

D'où le résultat. ■

2.6. Lemme. *Soient $\mathfrak{a}$ une sous-algèbre de Lie d'une algèbre de Lie semi-simple $\mathfrak{g}$, et $f \in \mathfrak{a}^*$. On suppose que $\mathfrak{a}^f$ est une algèbre de Lie commutative composée d'éléments semi-simples. Alors $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^f] \cap \mathfrak{a}^f = \{0\}$.*

Preuve. D'après les hypothèses, il existe un sous-espace vectoriel $\mathfrak{r}$ de $\mathfrak{a}$ vérifiant $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^f \oplus \mathfrak{r}$ et $[\mathfrak{a}^f, \mathfrak{r}] \subset \mathfrak{r}$. On en déduit $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^f] \subset \mathfrak{r}$. D'où l'assertion. ■

2.7. Théorème. *Soient $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple, $\text{rg}(\mathfrak{g})$ son rang, $k_{\mathfrak{g}}$ l'entier de 2.4, et $\mathfrak{b}$ une sous-algèbre de Borel de $\mathfrak{g}$.*

- (i) *L'espace $\mathfrak{b}^*$ contient un élément stable.*
- (ii) *L'indice de $\mathfrak{b}$ est égal à $\text{rg}(\mathfrak{g}) - k_{\mathfrak{g}}$.*

Preuve. Si $\mathfrak{a}$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, et si $y \in \mathfrak{g}$, on définit une forme linéaire $\varphi_{\mathfrak{a}}(x)$ sur $\mathfrak{a}$ en posant, pour $x \in \mathfrak{a}$:

$$\varphi_{\mathfrak{a}}(y)(x) = L(y, x).$$

Soient u comme en 2.5 et $f = \varphi_{\mathfrak{b}}(u) \in \mathfrak{b}^*$. On a $\mathfrak{b}^f = \{x \in \mathfrak{b}; [x, u] \in \mathfrak{n}\}$. Compte tenu de 2.5 et 2.6, on voit que f est un élément stable de $\mathfrak{b}^*$. L'assertion (ii) résulte alors de 2.5, car les ε_K , pour $K \in \mathcal{K}$, sont deux à deux fortement orthogonales, donc linéairement indépendantes. ■

Remarque. L'assertion de 2.7, (ii) est obtenue sous une forme différente en ([9], theorem 4.1).

3 Un contre-exemple

3.1. Il est donné dans [7] des exemples d'algèbres de Lie ne possédant aucune forme linéaire faiblement stable.

Soient $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple et $\mathfrak{p}$ une sous-algèbre parabolique de $\mathfrak{g}$. Il est affirmé dans [4] que $\mathfrak{p}^*$ contient un élément stable. Nous allons donner un exemple prouvant que cette affirmation est inexacte.

3.2. On conserve les notations et conventions de 2.1, et on suppose que $\mathfrak{g}$ est simple de type D_4 . On note $\Pi = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$, la racine α_2 étant liée aux α_i pour $i \neq 2$ (c'est la numérotation des racines de [1], p. 256). On note G le groupe adjoint de $\mathfrak{g}$, et on pose $\mathfrak{p} = \mathbb{k}X_{-\alpha_2} + \mathfrak{b}$. Ainsi, $\mathfrak{p}$ est une sous-algèbre parabolique minimale de $\mathfrak{g}$. On sait que $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{b}$ et $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{p}$ sont des sous-algèbres de Lie algébriques de $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{g}$. Soit B (resp. P) le plus petit sous-groupe algébrique de G tel que $\mathcal{L}(B) = \text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{b}$ (resp. $\mathcal{L}(P) = \text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{p}$). On a $B \subset P$, et B (resp. P) s'identifie au groupe adjoint de $\mathfrak{b}$ (resp. $\mathfrak{p}$).

L'ensemble $\mathcal{K}$ est constitué de $\Pi, \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. On en déduit que l'ensemble $\mathcal{E}$ des ε_K , $K \in \mathcal{K}$, est :

$$\mathcal{E} = \{X_{\alpha_1}, X_{\alpha_3}, X_{\alpha_4}, X_{\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}\}.$$

On conserve la notation $\varphi_{\mathfrak{a}}$ de la preuve de 2.7. Posons :

$$u = X_{-\alpha_1} + X_{-\alpha_3} + X_{-\alpha_4} + X_{-\alpha_1-2\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4}, \quad g = \varphi_{\mathfrak{b}}(u).$$

D'après 2.7, g est un élément stable de $\mathfrak{b}^*$. D'autre part, l'indice de $\mathfrak{b}$ est nul (2.4 et 2.7). Il en résulte que $\mathfrak{b}^*$ contient une B -orbite ouverte. C'est celle de g , et c'est aussi $\mathfrak{b}_{\gamma}^*$.

Supposons que l'ensemble $\mathcal{S}$ des éléments P -stables de $\mathfrak{p}^*$ soit non vide. Il est clair que c'est un ouvert de $\mathfrak{p}^*$. Il existe donc $f \in \mathcal{S}$ tel que $f|\mathfrak{b} \in \mathfrak{b}_r^*$. D'autre part, pour $\theta \in B$, on a $\theta(f) \in \mathcal{S}$ et $\theta(f)|\mathfrak{b} = \theta(f|\mathfrak{b})$. Il résulte alors de ce qui précède que l'on peut supposer f de la forme $f = \varphi_{\mathfrak{p}}(v)$, avec $v = \lambda X_{\alpha_2} + u$, où $\lambda \in \mathbb{k}$.

- Si $\lambda \neq 0$, on trouve facilement que $\mathfrak{p}^f = \mathbb{k}x$, avec

$$x = X_{-\alpha_2} + \mu_1 X_{\alpha_1} + \mu_2 X_{\alpha_3} + \mu_3 X_{\alpha_4} + \mu_5 X_{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} \\ + \mu_6 X_{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4} + \mu_7 X_{\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4} + \mu_8 X_{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4},$$

où $\mu_1, \dots, \mu_8$ sont des éléments non nuls de $\mathbb{k}$ (dépendant, par exemple, du choix d'une base de Chevalley de $\mathfrak{g}$).

- Si $\lambda = 0$, il vient $\mathfrak{p}^f = \mathbb{k}x$, avec

$$x = X_{-\alpha_2} + \mu_1 X_{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} + \mu_2 X_{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4} + \mu_3 X_{\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4},$$

où μ_1, μ_2, μ_3 sont des scalaires non nuls.

Soit $h \in \mathfrak{h}$ défini par $\alpha_1(h) = \alpha_3(h) = \alpha_4(h) = -\alpha_2(h) = 1$. Dans les deux cas précédents, il vient $[h, x] = x$. On a alors $[\mathfrak{p}, \mathfrak{p}^f] \cap \mathfrak{p}^f \neq \{0\}$, ce qui contredit 1.7. Ainsi, $\mathfrak{p}^*$ ne contient aucun élément P -stable.

References

- [1] BOURBAKI N., *Groupes et algèbres de Lie*, chapitres 4,5,6, Masson, 1981.
- [2] DIEUDONNÉ J., *Cours de géométrie algébrique*, tome 2, Presses Universitaires de France, 1974.
- [3] DIXMIER J., *Enveloping algebras*, Graduate Studies in Math., 11, AMS, 1996.
- [4] ELASHVILI A. G., On the index of parabolic subalgebras of semisimple Lie algebras, *Preprint*, 1990.
- [5] JANTZEN J. C., *Einhüllenden Algebren halbeinfacher Lie-Algebren*, Ergebnisse der Mathematik and ihrer Grenzgebiete, 3, Springer-Verlag, 1983.
- [6] JOSEPH A., A preparation theorem for the prime spectrum of a semisimple Lie algebra, *J. of Algebra* 48 (1977), 241-289.

- [7] KOSMANN Y., STERNBERG S., Conjugaison des sous-algèbres d'isotropie, *C. R. Acad. Sci. Paris Ser. A* t.279 (1974), 777-779.
- [8] TAUVEL P., *Introduction à la théorie des algèbres de Lie*, Diderot, 1998.
- [9] TROFIMOV V. V., Semi-invariants of the coadjoint representation of Borel subalgebras of simple Lie algebras, *Selecta Math. Sovietica* 8 (1989), 31-56.